





























<p>Triunghiul oarecare</p> $A = \frac{b \cdot h}{2}$ $A = \frac{a \cdot b \cdot \sin \angle C}{2}$ $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ 	<p>Triunghiul echilateral</p> $A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$ $h = \frac{l \sqrt{3}}{2}$ $a_p = \frac{l \sqrt{3}}{6}$ $R = 2a_p = \frac{l \sqrt{3}}{3}$ 	<p>Triunghiul dreptunghic</p> $A = \frac{c_1 \cdot c_2}{2}$ $A = \frac{ip \cdot h}{2}$ $h = \frac{c_1 \cdot c_2}{ip}$ 	<p>Triunghiul dreptunghic isoscel</p> $A = \frac{c^2}{2} = \frac{ip^2}{4} = h^2$ 	<p>Pătratul</p> $A = l^2 = \frac{d^2}{2}$ $d = l \sqrt{2}$ $a_p = \frac{l}{2}$ $R = \frac{d}{2}$ 
<p>Dreptunghiul</p> $A = L \cdot l$ $A = \frac{d^2 \cdot \sin \angle ddd}{2}$ $d = \sqrt{L^2 + l^2}$ 	<p>Paralelogramul</p> $A = b \cdot h$ $A = L \cdot l \cdot \sin \angle Ll$ $A = \frac{d_1 \cdot d_2 \cdot \sin \angle d_1 d_2}{2}$ 	<p>Rombul</p> $A = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$ $A = b \cdot h$ $A = l^2 \cdot \sin \angle ll$ 	<p>Trapezul</p> $A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$ $A = l_{mij} \cdot h$ $l_{mij} = \frac{B + b}{2}$ <p><i>Seg det de mij diag</i></p> $= \frac{B - b}{2}$ 	<p>Hexagonul regulat</p> $A = 6 \cdot \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$ $a_p = \frac{l \sqrt{3}}{2}$ $R = l$ $D = 2R = 2l$ $d = l \sqrt{3}$ 
<p>Teoreme în triunghiul dreptunghic</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. T înălțimii: $h^2 = pr_{c_1} \cdot pr_{c_2}$ 2. T catetei: $c^2 = ip \cdot pr_c$ 3. T Pitagora: $ip^2 = c_1^2 + c_2^2$ 4. T 30°: Cateta opusă unghiului de 30° este jumătate din ipotenuză 5. T medianei: Mediana dusă pe ipotenuză este jumătate din ipotenuză. 6. $h = \frac{c_1 \cdot c_2}{ip}$ 	<p>Cubul</p> $A_f = l^2$ $A_l = 4l^2$ $A_t = 6l^2$ $V = l^3$ $d_c = l \sqrt{3}$ $d_f = l \sqrt{2}$  <p>Cercul</p> $D = 2R$ $L = 2\pi R$ $L = \pi D$ $A = \pi R^2$ 	<p>Paralelipipedul dreptunghic</p> $A_b = L \cdot l$ $A_l = P_b \cdot h$ $A_t = A_l + 2 \cdot A_b$ $A_t = 2Ll + 2Lh + 2lh$ $V = A_b \cdot h = L \cdot l \cdot h$ $d = \sqrt{L^2 + l^2 + h^2}$ $d_{fata} = \sqrt{L^2 + l^2}$ 	<p>Prisma triunghiulară regulată</p> $A_b = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$ $A_l = P_b \cdot h$ $A_t = A_l + 2 \cdot A_b$ $V = A_b \cdot h$ 	<p>Prisma patrulateră regulată</p> $A_b = l^2$ $A_l = P_b \cdot h$ $A_t = A_l + 2 \cdot A_b$ $V = A_b \cdot h$ $d = \sqrt{l^2 + l^2 + h^2}$ 
<p>Numere pitagoreice</p> <p>3,4,5 3k,4k,5k</p> <p>În triunghiul dr. is. $x, x, x\sqrt{2}$ În triunghiul 30-60-90 $x, 2x, x\sqrt{3}$</p>	<p>Tetraedrul regulat</p> $A_f = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$ $A_l = 3 \cdot \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$ $A_t = 4 \cdot \frac{l^2 \sqrt{3}}{4} = l^2 \sqrt{3}$ $V = \frac{A_b \cdot h}{3}$ $h_{tetraedru} = \frac{l \sqrt{6}}{3}$ 	<p>Piramidă triunghiulară regulată</p> $OM = a_p = \frac{l \sqrt{3}}{6}$ $OA = R = 2 \cdot OM$ $A_b = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$ $A_l = \frac{P_b \cdot a_p}{2}$ $A_t = A_l + A_b$ $V = \frac{A_b \cdot h}{3}$ 	<p>Piramidă patrulateră regulată</p>  $OM = a_p = \frac{l}{2}$ $AC = BD = d = l \sqrt{2}$ $OA = OB = OC = OD = \frac{d}{2}$ $A_b = l^2$ $A_l = \frac{P_b \cdot a_p}{2}$ $A_t = A_l + A_b$ $V = \frac{A_b \cdot h}{3}$	<p>Piramidă hexagonală regulată</p>  $OM = \frac{l \sqrt{3}}{2}$ $R = l$ $A_b = 6 \cdot \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$ $A_l = \frac{P_b \cdot a_p}{2}$ $A_t = A_l + A_b$ $V = \frac{A_b \cdot h}{3}$
<p>Prisma hexagonală regulată</p> $A_b = 6 \cdot \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$ $A_l = P_b \cdot h$ $A_t = A_l + 2 \cdot A_b$ $V = A_b \cdot h$ 				

Trunchiul de piramidă $A_b = \dots \dots \dots$ $A_l = \frac{(P_b + P_b) \cdot a_{p\ tr}}{2}$ $A_t = A_l + A_b + A_B$ $V = \frac{h}{3} (A_B + A_b + \sqrt{A_B \cdot A_b})$	Cilindrul $A_b = \pi R^2$ $A_l = 2\pi R G$ $A_t = A_l + 2 \cdot A_b$ $V = A_b \cdot h$ 	Conul $A_b = \pi R^2$ $A_l = \pi R G$ $A_t = A_l + A_b$ $V = \frac{A_b \cdot h}{3}$ 	Trunchiul de con $A_b = \pi R^2$ $A_l = \pi G (R + r)$ $A_t = A_l + A_b + A_B$ $V = \frac{\pi h}{3} (R^2 + r^2 + R \cdot r)$	Sfera $A = 4\pi R^2$ $V = \frac{4\pi R^3}{3}$ 
---	---	--	---	--

$\sin \alpha = \frac{\text{cat. op.}}{\text{ip}}$ $\cos \alpha = \frac{\text{cat. al.}}{\text{ip}}$ $\text{tg} \alpha = \frac{\text{cat. op.}}{\text{cat. al.}}$ $\text{ctg} \alpha = \frac{\text{cat. al.}}{\text{cat. op.}}$ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$	<table> <tr> <th></th><th>30°</th><th>45°</th><th>60°</th></tr> <tr> <td>sin</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{2}}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{3}}{2}$</td></tr> <tr> <td>cos</td><td>$\frac{\sqrt{3}}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{2}}{2}$</td><td>$\frac{1}{2}$</td></tr> <tr> <td>tg</td><td>$\frac{\sqrt{3}}{3}$</td><td>1</td><td>$\sqrt{3}$</td></tr> <tr> <td>ctg</td><td>$\sqrt{3}$</td><td>1</td><td>$\frac{\sqrt{3}}{3}$</td></tr> </table>		30°	45°	60°	sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	ctg	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	Teorema lui Thales Dacă $DE \parallel BC \Rightarrow \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ 	T.F.A. Dacă $DE \parallel BC \Rightarrow \triangle ADE \sim \triangle ABC$ $\Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$ 
	30°	45°	60°																				
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$																				
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$																				
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$																				
ctg	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$																				
Teorema bisectoarei AD bisectoare $\Rightarrow \frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$ 	Mediana împarte un triunghi în două triunghiuri echivalente (de arii egale). Diagonalele împart un paralelogram în patru triunghiuri echivalente. 	Într-un triunghi dreptunghic înălțimea opusă unghiului de 15° este un sfert din ipotenuză.	Funcții $A(x, y) \in G_f \Leftrightarrow f(x) = y$ $G_f \cap Ox$ Rezolvăm ecuația $f(x) = 0 \Rightarrow A(\dots, 0)$ $G_f \cap Oy$ Calculăm $f(0) = \dots \Rightarrow B(0, \dots)$ $G_f \cap G_g$ Rezolvăm ecuația $f(x) = g(x)$																				
Un trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare are înălțimea egală cu linia mijlocie $h = \frac{B+b}{2}$, adică media aritmetică a bazelor.		Un trapez dreptunghic cu diagonalele perpendiculare are înălțimea egală cu media geometrică a bazelor. $h = \sqrt{B \cdot b}$																					
Formule de calcul $(a+b)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2$ $(a-b)^2 = a^2 - 2 \cdot a \cdot b + b^2$ $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ $(x-5)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 = x^2 - 10x + 25$ $(x+7)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 7 + 7^2 = x^2 + 14x + 49$ $(x-4)(x+4) = x^2 - 4^2 = x^2 - 16$ $(x-3)(x+5) = x^2 + 5x - 3x - 15$ $(3x-2)^2 = (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 2 + 2^2 = 9x^2 - 12x + 4$ $(5x-2)^2 = (5x)^2 - 2 \cdot 5x \cdot 2 + 2^2 = 25x^2 - 20x + 4$ $(3x-5)(3x+5) = (3x)^2 - 5^2 = 9x^2 - 25$ $(2x-3)(3x-7) = 6x^2 - 14x - 9x + 21$		Descompuneri Factor comun $3x + 6 = 3(x + 2)$ $10x - 15 = 5(2x - 3)$ $x^2 - 4x = x(x - 4)$ $5x(x - 6) - 2(x - 6) = (x - 6)(5x - 2)$ $x^3 + x^2 - 4x - 4 = x^2(x + 1) - 4(x + 1) = (x + 1)(x^2 - 4)$ $= (x + 1)(x + 2)(x - 2)$ $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$ $9x^2 - 49 = (3x - 7)(3x + 7)$ $(x + 3)^2 - 49 = (x + 3 - 7)(x + 3 + 7) = (x - 4)(x + 10)$ $(2x - 5)^2 - (x + 4)^2 = (2x - 5 - x - 4)(2x - 5 + x + 4) = (x - 9)(3x - 1)$ $a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2 = (a + b)^2$ $9x^2 - 12x + 4 = (3x - 2)^2$ $x^2 - 12x + 36 = (x - 6)^2$ Spargere $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$ $\vdots$ -1 -3																					